

薬局 だより

KI PHARMACY

2021年5月号

新型コロナワクチン



お薬や健康に関するお悩みは、お気軽にケーアイ調剤薬局へご相談下さい。

新型コロナワクチンを受ける流れ

1 「接種券(クーポン券)」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届く

接種の時期より前に、住んでいる各市町村から「**接種券(クーポン券)**」と「**新型コロナワクチン接種のお知らせ**」が届きます。

ワクチンの供給は徐々に行われているので、接種順位を決めて接種が行われています。現在の接種順位は ①医療従事者等 ②高齢者(昭和32年4月1日以前に生まれた方) ③高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方 ④それ以外の方 となっており、自分の接種時期が来るまで待ついただくこととなります。高齢者への接種は、一部の市町村で4月12日に開始され、順次拡大していく予定です。

2 接種の予約

ご自身が接種可能な時期が来たことを確認し、電話やインターネットで接種の予約をします。

接種会場は「**コロナワクチンナビ** (<https://v-sys.mhlw.go.jp/>)」でも確認することができます。

3 接種当日までの事前確認

体調や病状によっては接種を受けられないことがあるため、通院している方は、かかりつけの医師に接種を受けて良いか確認しておくで安心です。

4 接種当日に準備するもの

市町村から届いた「**接種券(クーポン券)**」と「**本人確認書類(運転免許所や健康保険所など)**」を持って行きましょう。

5 1回目の接種

予約した会場で、予約した日時に接種を受けます。

接種券(クーポン券)は切り離さず、台紙ごと会場へ持参します。ワクチンは、肩の筋肉に注射するので、**Tシャツなど肩を出せる服を着て**いきましょう。

6 2回目の手続き

1回目と同じ流れで予約をし、接種を受けます。ファイザーのワクチンでは**1回目から3週間後に2回目を接種**します。もし、この間隔を超えてしまった場合には、できるだけ早く接種しましょう。

接種後も感染症対策は続けましょう。

(You tube 厚生労働省チャンネル「新型コロナワクチンを受けるには」
<https://www.youtube.com/watch?v=sMUQK0ro4zY> 参照)

新型コロナワクチン関連 リンク集

・厚生労働省「新型コロナワクチンについて」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

・厚生労働省「コロナワクチンナビ」

<https://v-sys.mhlw.go.jp/>

・首相官邸「新型コロナワクチンについて」

<https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html>

・ファイザー「ファイザー新型コロナワクチンの接種を受ける方とご家族のためのサイト」

<https://www.pfizer-covid19-vaccinated.jp/>

新型コロナワクチンに関する Q&A (上記サイト参照)

Q. 接種を受けることは強制ですか？

A. 国は、国民の皆さまにワクチン接種を受けていただくようお勧めしていますが、強制ではありません。同意なく、接種が行われることはなく、ワクチン接種を受ける方には、**接種による感染症予防の効果と副反応のリスクについて理解した上で、自らの意志で接種を受けていただきます。**周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人を差別したりすることのないようにしましょう。

Q. ワクチン接種を受けたら、コロナにかからなくなりますか？

A. ワクチン接種後でも感染する可能性はあります。ワクチン接種は発症を予防するものであり、発症予防効果も 100%ではありません。また、高い発症予防効果が得られるのは、**2 回目の接種から 7 日以上経っ**

てからと言われてています。**接種後も、基本的な感染症対策(手洗い、マスク、密を避ける等)は必要だと考えられています。**

Q. ワクチン接種の際に気を付けることはありますか？

A. ワクチン接種は、**基本的に体調が良い時に受けます。**接種前は、できるだけ体調を崩さないように気を付けて過ごしましょう。また、接種当日にいつもと体調が異なる場合は、必ず医師に伝えましょう。

今まで、予防接種で具合が悪くなったことがある方や、医薬品による副作用がある方、飲食品へのアレルギーがある方などは、事前にかかりつけ医に相談するか、接種当日に医師に相談しましょう。

Q. どのような副反応がありますか？

A. 多い副反応は**接種部位の痛み**です。その他、頻度の高い副反応として、**倦怠感、頭痛、悪寒、筋肉痛、関節痛**などが報告されています。だいたい数日以内で良くなるのが分かっていますが、万が一ワクチン接種によって健康被害が生じた場合には、国による健康被害救済制度があります。申請に係る手続きについては、接種を受けた各自治体に相談しましょう。

※血をサラサラにする薬を飲まれている方

飲んでいる薬によっては、出血が止まりにくいことがあるため、予診票で薬の種類を聞かれます。以下の薬を飲んでいる方は、接種後の出血に注意が必要なため、必ず薬名を伝えましょう。

- ・ワーファリン(ワルファリンカリウム)
- ・プラザキサ(ダビガトランエテキシラート)
- ・イグザレルト(リバーロキサバン)
- ・エリキュース(アピキサバン)
- ・リクシアナ(エドキサバントシル酸塩水和物)